

APRIL 2012

GOED BEGONNEN... IS HALF GEWONNEN!

De droogstand is ook op het gebied van de uiergezondheid een belangrijke periode voor melkkoeien. Enerzijds genezen sommige koeien met een **bestaande infectie** (= koeien met een verhoogd celgetal) gemakkelijker tijdens de droogstand dan na een behandeling tijdens de lactatie. De uier komt immers tot rust én er kunnen langwerkende antibiotica worden gebruikt. De droogstand biedt dus zeker **KANSEN**.

Anderzijds vormt diezelfde droogstand ook een **BEDREIGING** voor de uiergezondheid: een groot deel van de **nieuwe infecties** ontstaat immers tijdens de droogstand en kan later tijdens de lactatie voor problemen zorgen. Preventie is hier dus zeker op zijn plaats.



Een goed droogzetmanagement bestaat onder andere uit:

1. Geïnfecteerde koeien droogzetten met langwerkende antibiotica – extra beschermen tegen nieuwe infecties met omgevingskiemen kan door te combineren met een inwendige speenafsluiter – steeds proper werken bij inbrengen;
2. Niet-geïnfecteerde koeien droogzetten met een inwendige speenafsluiter ter bescherming tegen nieuwe infecties – steeds proper werken bij inbrengen;
3. Voorzien van een droge, propere en comfortabele omgeving (net zo droog, proper en comfortabel als voor de lacterende koeien);
4. Voorzien van een aangepaste droogstandsvoeding ter voorbereiding van een vlotte transitie;
5. Scheren of branden van de uiers – korte haren houden de uiers makkelijker proper;
6. (Preventief) bekappen van de klauwen – manke koeien liggen vaker neer waardoor de spenen meer en in nauwer contact met de omgeving komen en waardoor omgevingskiemen gemakkelijker via de slotgaten de uier kunnen binnendringen.

M-team, altijd paraat als het om uw melk gaat!

