

MELK NORMAAL... STOPPEN MET BEHANDELEN?

Als we een geval van *klinische (zichtbare) uierontsteking* behandelen dan moeten we steeds streven naar **klinische en bacteriële genezing**. Het verschil en belang worden uitgelegd:

Klinische genezing: de symptomen zijn verdwenen, de melk is normaal, het kwartier is ongetroffen, de koe is niet meer ziek.

Klinische en bacteriële genezing: niet alleen de symptomen zijn verdwenen maar ook de mastitisverwekker is niet meer aanwezig in het kwartier.

Als er te snel gestopt wordt met behandelen van een klinische uierontsteking dan is de kans reëel dat de kiem die de oorzaak was van de problemen aanwezig blijft in het behandelde kwartier. Er is met andere woorden een *onzichtbare of subklinische uierontsteking* ontstaan (het celgetal blijft verhoogd) en de kans is groot dat na een tijd de symptomen terug de kop opsteken (de koe hervalt, er is sprake van een recidief).

Concreet:

- Streef bij het behandelen van elk geval van klinische mastitis naar **klinische en bacteriële genezing**.
- Stop niet met behandelen op het moment dat de symptomen zijn verdwenen (= klinische genezing) maar behandel nog minstens één dag langer. Dit maximaliseert de kans op bacteriële genezing.
- Laat u niet verleiden om een ingezette behandeling te vroeg te stoppen om de melk sneller mee kunnen geven... **denk op lange termijn!**
- Overleg steeds met uw bedrijfsdierenarts.

