

JUNI 2010

BEHANDELPLAN VOOR KLINISCHE MASTITIS... EEN MUST!

Om uiergezondheidsproblemen op melkveebedrijven aan te pakken of te voorkomen worden heel wat antibiotica ingezet. Denk maar aan het systematische gebruik van droogzetters. Verstandig omspringen met deze producten is echter belangrijk, niet alleen om de eigen koeien succesvol te kunnen blijven behandelen maar ook omdat melkveehouders een belangrijke verantwoordelijkheid dragen naar de consument toe (veilig voedsel).

Behandelen van gevallen van klinische mastitis volgens een vooraf opgesteld protocol (volgens een *behandelplan*) biedt de mogelijkheid om gestructureerd te werken. Dit leidt tot tijdswinst en efficiënter behandelen en laat ook toe na te gaan of een behandeling wel succesvol is.

Werken met een *behandelplan voor klinische mastitis* leidt tot rust en zekerheid, een lager en verantwoord gebruik van geneesmiddelen, betere genezingskansen voor de koeien en veilige en gezonde melk. Praat er vandaag nog over met uw dierenarts en begin er morgen mee.

Klinische mastitis			
Behandelingsprogramma voor			
Opgesteld door			
Datum			
A	Mastitis protocol A Afwijkende melk, niet-zieke koe	Duur behandeling	Wachttijd melk
	Antibiotica in de uier:		
	Antibiotica in de nek:		
	Ontstekingsremmer in de nek:		
B	Mastitis protocol B Afwijkende melk, afwijkend kwartier, licht zieke koe	Duur behandeling	Wachttijd melk
	Antibiotica in de uier:		
	Antibiotica in de nek:		
	Ontstekingsremmer in de nek:		
C	Mastitis protocol C Afwijkende melk, afwijkend kwartier, zeer zieke koe (Consultatie dierenarts en neem een melktaal)	Duur behandeling	Wachttijd melk

Bron: Boehringer Ingelheim AH en *M-team*

Concreet

- Overloop met uw bedrijfsdierenarts de resultaten van de bacteriologische onderzoeken van de klinische gevallen van mastitis van de laatste maanden.
- Beslis op basis van de bacteriën die op het bedrijf voorkomen en hun (on)gevoeligheden welke antibiotica zullen worden ingezet.
- Voer elke behandeling strikt uit en noteer netjes alle behandelingen per dier.
- Bekijk na enkele maanden samen met uw dierenarts of de behandelresultaten voldoen - indien dat niet het geval is, zoek dan de reden(en) en pas het *behandelplan* aan.

M-team, altijd paraat als het om uw melk gaat!

