

JUNI 2011

FICHE:

MASTITISVERWEKKER

STREPTOCOCCUS UBERIS



BELANG:

- *S. uberis* veroorzaakt zowel *klinische* als *subklinische* mastitis;
- *S. uberis* staat in de top drie van de meest voorkomende mastitisverwekkers in Vlaanderen.

PREVENTIE: ⊕

- de meeste *S. uberis*-stammen gedragen zich als *omgevingsgebonden* mastitisverwekkers:
 - ✓ ze hebben de koe en uier niet nodig om te overleven;
 - ✓ ze zijn vooral terug te vinden in stro, mest en de ligboxen.
- *S. uberis*-infecties kunnen het best voorkomen worden door zowel voor de droogstaande als de melkgevende koeien een *propere en droge huisvesting* te voorzien.

BEHANDELING:

- *S. uberis*-infecties zijn over het algemeen gemakkelijk te genezen;
- *S. uberis* is vaak ongevoelig voor meerdere soorten antibiotica - behandel daarom steeds op basis van een *antibiogram* of op basis van een aangepast *bedrijfsbehandelplan*.

KLINISCHE MASTITIS		SUBKLINISCHE MASTITIS	
1	<i>Escherichia coli</i>	1	Coagulase-negatieve stafylokokken
2	<i>Streptococcus uberis</i>	2	<i>Corynebacterium bovis</i>
3	<i>Staphylococcus aureus</i>	3	<i>Streptococcus uberis</i>

Voorkomen belangrijkste mastitisverwekkers in Vlaanderen op basis van de gegevens van het labo van het **M-team**

M-team, altijd paraat als het om uw melk gaat!

