

MAI 2011

LE LAIT REDEVIENT NORMAL... FAUT-IL POUR AUTANT STOPPER LE TRAITEMENT ?

Lorsque nous traitons *un cas de mammite clinique* (= visible), nous devons toujours nous fixer comme objectif **la guérison clinique et bactériologique**. Quelle est la différence et l'importance de cette double guérison?

- **Guérison clinique:** les symptômes ont disparu, le lait est normal, le quartier est dégonflé, la vache n'est plus malade.
- **Guérison clinique et bactériologique:** non seulement les symptômes ont disparu mais en plus, le germe responsable de la mammite n'est plus présent dans le quartier.

Si vous stoppez trop rapidement le traitement d'une mammite clinique, il existe un risque réel que le germe initialement responsable de l'infection reste présent dans le quartier traité. Autrement dit, une mammite subclinique (= invisible) risque de se développer (le taux cellulaire reste élevé) et il est plus que probable qu'après un certain temps, les symptômes réapparaissent (la vache rechute, on parle alors de récurrence).

Concrètement:

- Lors du traitement de chaque mammite clinique, visez **la guérison clinique et bactériologique**.
- Ne stoppez pas le traitement dès le moment où les symptômes disparaissent (= guérison clinique), mais traitez encore au moins un jour en plus pour maximiser la chance de guérison bactériologique.
- Ne cédez pas à la tentation de stopper trop rapidement un traitement en cours dans le but de recommencer à livrer le lait plus vite. **Pensez à long terme!**
- Consultez toujours votre vétérinaire.



M-team, altijd paraat als het om uw melk gaat!

