

AVRIL 2012

BIEN DÉMARRER... POUR MIEUX TERMINER !

Le tarissement est aussi une période importante pour la santé mammaire de la vache laitière. D'une part, certaines vaches guérissent plus facilement d'une **infection existante** (= vaches à taux cellulaire élevé) pendant le tarissement qu'après un traitement effectué pendant la lactation. En effet, le pis est mis au repos et on peut alors utiliser des antibiotiques à longue durée d'action. Le tarissement offre donc à coup sûr des **OPPORTUNITÉS**.

D'autre part, ce même tarissement est aussi une **MENACE** pour la santé du pis: une grande partie des **nouvelles infections** apparaissent pendant le tarissement et peuvent causer des problèmes plus tard, pendant la lactation. La prévention est donc sans aucun doute primordiale.



Un bonne gestion du tarissement tient entre autre compte des points suivants:

1. Tarir les vaches infectées avec un antibiotique à longue durée d'action - offrir une protection supplémentaire contre les nouvelles infections par les germes environnementaux en le combinant avec un obturateur interne de trayon - toujours travailler proprement lors de l'application;
2. Tarir les vaches non infectées avec un obturateur interne de trayon pour les protéger contre les nouvelles infections - toujours travailler proprement lors de l'application;
3. Veiller à ce que l'environnement soit propre, sec et confortable (aussi propre, sec et confortable que pour les vaches en lactation);
4. Prévoir une alimentation adaptée au tarissement en vue d'une transition sans problèmes;
5. Raser les pis ou les tondre à la flamme - les poils courts maintiennent plus facilement les pis propres;
6. Entretenir (préventivement) les sabots - les vaches boiteuses se couchent plus souvent et par conséquent, leurs trayons sont en contact plus fréquent et plus étroit avec le sol, ce qui permet aux germes d'environnement de pénétrer plus facilement via l'orifice du trayon.

M-team, altijd paraat als het om uw melk gaat!

